

CONFLUX® - Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e simili e rucola, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.
Fludioxonil - Codice FRAC 12
Ciprodinil - Codice FRAC 9

RICAVARE IL FOGLIO CON LE ISTRUZIONI PER L'USO



ATTENZIONE

CONFLUX®

Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
ciprodinil puro..... g 37,5
fludioxonil puro..... g 25
coformulantiq.b. a g 100
contiene: ac. naftalensulfonico, dibutil, sale sodico.



INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

EUH208 - Contiene ciprodinil. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Registrazione Ministero della Salute n. 18747 del 29/10/2024

UFI : FUMV-EC4J-K10X-0VEJ

Titolare dell'autorizzazione:

Life Scientific Ltd - Block 4, Belfield Office Park - Beech Hill Road
Clonskeagh, Dublin 4 D04 V972 - IRELAND

Officine di produzione:

Schirm GmbH - Mecklenburger Straße 229, 23568 Lübeck, Germany

Etichetta autorizzata con Decreto
Dirigenziale del 29 ottobre 2024

Prima dell'uso leggere il
foglio illustrativo

Smaltire le confezioni
secondo le norme vigenti

Lotto n. : vedi imballaggio



17020411105_V2

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare guanti in nitrile. Durante l'applicazione del prodotto usare guanti in nitrile e tuta completa da lavoro. Attendere la completa asciugatura dell'irrorato prima di rientrare nelle aree trattate.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali pari a: 3 metri per lattughe e simili, rucola; 10 metri per vite e floricole; 15 metri per albicocco, pesco, susino, ciliegio e pero.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto vegetata dai corpi idrici superficiali pari a 5 metri per cipolla; 10 metri per fragola, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchine, finocchio.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Sintomi:** aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con sovradosaggi.

Terapia: sintomatica.

"Avvertenza" Consultare un Centro Antiveneni.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

CARATTERISTICHE

CONFLEX[®] è un fungicida in granuli idrodispersibili per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e simili, rucola, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna dal pero.

Costituito da una miscela di due diversi principi attivi, il ciprodinil ed il fludioxonil, CONFLEX[®] è dotato di attività parzialmente sistemica nonché di copertura: presenta inoltre un meccanismo d'azione diverso da quello di benzimidazoli, dicarbossimidi ed inibitori della biosintesi degli steroli.

CONFLEX[®] è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Utilizzare i dosaggi inferiori nelle zone a bassa pressione di infezione.
 - I dosaggi per ettaro sono calcolati sulla base di volumi di applicazione pari a 10 hl/ha (15 hl/ha sui fruttiferi).
- Per trattamenti con volumi maggiori non superare la dose massima per ettaro.

Coltura	Patogeno	Dose (g/100 l)	Dose (Kg per ettaro)	Modalità/Epoca di applicazione
Vite (pieno campo)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	80	0,6 - 0,8	1 trattamento in pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invaiaitura o in pre-raccolta. Effettuare al massimo 2 trattamenti.
	Marciumi secondari del grappolo (<i>Aspergillus</i> spp. <i>Penicillium</i> spp.)	80	0,8	
Fragola (serra e pieno campo)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	80	0,8	Effettuare 2 - 3 trattamenti nelle fasi: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.
Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchini (serra e pieno campo)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	60 - 80	0,6 - 0,8	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10 - 14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Albicocco, pesco, susino, ciliegio	Moniliosi rami e fiori (<i>Monilia laxa</i>)	30	0,3	Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento alla caduta dei petali.
	Moniliosi dei frutti (<i>Monilia</i> spp.)	60	0,8 - 1	1 - 2 trattamenti in pre - raccolta.
Floricole (serra e pieno campo)	<i>Botrytis</i> spp.	80	0,8 - 1	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10 - 14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Lattughe e simili, rucola (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia (<i>Sclerotinia</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i>)	50 - 70	0,5 - 0,7	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10 -12 giorni.

Coltura	Patogeno	Dose (g/100 l)	Dose (Kg per ettaro)	Modalità/Epoca di applicazione
Finocchio (pieno campo)	Marciume del colletto (<i>Sclerotinia</i> spp.)	60 - 80	0,8	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti la malattia. Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10 - 14 giorni.
Pero	Maculatura bruna (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	60 - 80	0,8 - 1	Trattamenti ad intervalli di 10 - 12 giorni in prossimità della raccolta o nelle fasi più critiche per la malattia. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Cipolla (pieno campo)	Muffa grigia (<i>Botrytis squamosa</i> , <i>Botrytis cinerea</i>)	80 - 100	0,8 - 1	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10 - 12 giorni

Compatibilità

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: Per evitare o ritardare l'insorgere di fenomeni di resistenza, attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare CONFLUX® con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

Fitotossicità

Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele.

Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:

uva da vino: 21 giorni; albicocco, susino, lattughe e simili, rucola: 14 giorni; pero, pesco, ciliegio, uva da tavola, cipolla, finocchio, cetriolo, zucchini, fragola, pomodoro, peperone, melanzana: 7 giorni

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

® CONFLUX è un marchio registrato di Life Scientific Ltd.

CONFLUX® - Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e simili e rucola, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.
Fludioxonil - Codice FRAC 12
Ciprodinil - Codice FRAC 9

ATTENZIONE



CONFLUX®
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
ciprodinil puro..... g 37,5
fludioxonil puro..... g 25
coformulantiq.b. a g 100
contiene: ac. naftalensulfonico, dibutil, sale sodico.



INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

EUH208 - Contiene ciprodinil. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Registrazione Ministero della Salute n. 18747 del 29/10/2024

UFI : FUMV-EC4J-K10X-0VEJ

Titolare dell'autorizzazione:

Life Scientific Ltd - Block 4, Belfield Office Park - Beech Hill Road
Clonskeagh, Dublin 4 D04 V972 - IRELAND

Officine di produzione:

Schirm GmbH - Mecklenburger Straße 229, 23568 Lübeck, Germany

Etichetta autorizzata con Decreto
Dirigenziale del 29 ottobre 2024

Prima dell'uso leggere il
foglio illustrativo

Smaltire le confezioni
secondo le norme vigenti

Lotto n. : vedi imballaggio



170120411105_V2