

LOSKA®

FONGICIDE BLÉ - EC - 100g Prothioconazole + 48 g Metconazole

LA 1^{ère} INNOVATION FORMULÉE DE LIFSCIENTIFIC



Gestion pérenne et efficace
du complexe Septoriose / Rouilles



Combinaison de 2 triazoles de sous groupes différents pour optimiser l'effet de synergie et lutter contre les phénomènes résistance




Introduction du Metconazole peu utilisé dans les programmes blé



Sébastien - 43 ans, Agriculteur

Investir dans un programme fongicide afin de protéger mes blés est devenu un coût significatif et ma marge en pâtit, en quoi LOSKA® répond à mes besoins ?



Lifescientific France

L'association du **prothioconazole** et du **metconazole** offre une solution performante contre le complexe Septoriose / Rouille Brune, le potentiel de vos blés est donc protégé contre les risques majeurs. De plus, la protection que présente le LOSKA® est un levier avec un positionnement technico-économique, c'est-à-dire en lien avec vos objectifs de rentabilité.

FOLLOW US ON



lifescientific


Les 2 raisons de choisir le fongicide LOSKA®

LA FORMULATION DU FONGICIDE LOSKA®, un atout majeur dans son utilisation

- Dosage supérieur de l'agent tensioactif mouillant pour une répartition optimale sur les feuilles
- Adjuvant huileux supplémentaire qui booste la pénétration des matières actives et garantit une émulsification ultrafine et stable


Comparaison de la Formulation LOSKA® vs. Prothio125-Tebuco 125 et matières actives solo par 2 laboratoires indépendants
Source: Silsoe Spray Applications Unit (UK) (lab. indépendant)

MEILLEURE COUVERTURE DE LA FEUILLE



MEILLEURE PÉNÉTRATION DU PROTHIOCONAZOLE DANS LA PLANTE

Prothioconazole Cuticle Penetration Comparison



LA GESTION DU COMPLEXE SEPTORIOSE / ROUILLE BRUNE PAR LE FONGICIDE LOSKA®

- **Diversification des triazoles.** Le Metconazole est relativement peu utilisé dans les programmes blé seulement 9% des ha déployés (Kynetec 2024).
- **Le Metconazole, l'atout Rouille Brune.** Demain, le Metconazole sera la meilleure triazole sur rouilles avec le retrait prévu du Tebuconazole.
- **Les triazoles (IDM) associés plutôt que seules.** Une combinaison de 2 triazoles de sous – groupes différents permet de réduire le risque de résistance aux triazoles en *Septoria tritici*.

Tableau des usages autorisés (traitement des parties aériennes)

Usages	Dose maximale d'emploi	Nbre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traité aquatique (mètres)
15103214 Blé*Trit Part. Aer.*Rouille(s)	1 L/ha	1/an	entre les stades BBCH 39 et BBCH 49	F (BBCH 49)	20 (dont DVP 5)
	1 L/ha	1/an	entre les stades BBCH 39 et BBCH 49	F (BBCH 49)	20
15103221 Blé*Trit Part. Aer.* Septoriose(s)	1 L/ha	1/an	entre les stades BBCH 39 et BBCH 49	F (BBCH 49)	20 (dont DVP 5)
	1 L/ha	1/an	entre les stades BBCH 39 et BBCH 49	F (BBCH 49)	20

DVP : dispositif végétalisé permanent – Délai de rentrée des travailleurs sur la parcelle : 48 heures après traitement – DSPPR : 10 mètres

LOSKA® – AMM N°2240545– Composition : 100 g/L – prothioconazole 48 g/L – métconazole.

- H302 Nocif en cas d'ingestion
H315 Provoque une irritation cutanée
H317 Peut provoquer une allergie cutanée
H318 Provoque des lésions oculaires graves
H361d Susceptible de nuire au fœtus
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.
SPe 2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45% pour les usages céréales d'hiver.
SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres en bordure des points d'eau pour les usages céréales d'hiver.
SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres en bordure des points d'eau pour les usages céréales de printemps
Spa 1 Pour éviter le développement de la résistance de certaines maladies des céréales au prothioconazole et au metconazole, le nombre d'application du produit est limité à 1 application maximum par cycle cultural sur blé et triticales.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

DANGER



lifescientific

Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l'étiquette du produit ou sur www.lifescientific.com/fr/ Life Scientific France – 11-13 rue des Aulnes – 69760 Limonest – 04 69 98 23 41 – Distribution produits phytos pro – Siret : 840 763 056 000 24 – TVA : FR23 840 763 056

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.