

LS METCONAZOLE 90

FUNGICIDA

FRUMENTO
ORZO
COLZA

90 g/L metconazolo
Concentrato emulsionabile (EC)

CONTENUTO NETTO:

1L

DA UTILIZZARE SOLO COME
FUNGICIDA PROFESSIONALE

lifescientific

LS METCONAZOLE 90

Fungicida ad ampio spettro d'azione per il controllo delle malattie di frumento, orzo e colza

Titolare dell'autorizzazione : Life Scientific Ltd - Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road - Dublin 4, IRELAND
Tel. + 353 1 2632024
Stabilimenti di produzione : Chemark Zrt - H-8182 Berhida, Peremarton gyártelep 06/75 hrsz, HU - Tel. +36 20 459 6996
Tipo di azione : Codice FRAC 3
Formulazione : Concentrato emulsionabile (EC)

ATTENZIONE



LS METCONAZOLE 90 COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono: METCONAZOLO g 8,6 (90 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: ALCOLI, C9-11; ETOSILLATI, DIETILEN GLICOLE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H373 Può provocare danni ai reni in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P260 Non respirare la polvere/i gas/la nebbia/i vapori.
P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P314 In caso di malessere, consultare un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Reg. del Ministero della Salute n. 18499 del 16/07/2024

UFI : 1QYD-JEY1-K00G-06RV

Leggere le istruzioni accluse prima dell'uso.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 luglio 2024

Lotto n. : vedi imballaggio



5

170190411101_V1

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

Trattare in modo sintomatico. In caso di ingestione non provocare il vomito, sciacquare la bocca con acqua corrente solo se l'infortunato è cosciente e consultare immediatamente il medico.
Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LS METCONAZOLE 90 è un prodotto fungicida contenente metconazolo, sostanza attiva sistemica appartenente al gruppo chimico dei triazoli, dotata di lunga persistenza d'azione e con attività sia preventiva sia curativa.

LS METCONAZOLE 90 è indicato per il controllo delle patologie fungine fogliari e della spiga elencate nella tabella seguente.

Coltura	Malattia fungina
Frumento (tenero e duro)	- Oidio (<i>Blumeria graminis</i>) - Ruggini (<i>Puccinia striiformis</i> , <i>P. recondita</i>) - Septoriosi (<i>Septoria tritici</i> , <i>Phaeosphaeria nodorum</i>) - Fusariosi (<i>Fusarium culmorum</i> , <i>F. graminearum</i> , <i>F. avenaceum</i> , <i>Microdochium nivale</i>)
Orzo	- Oidio (<i>Blumeria graminis</i>) - Ruggine bruna (<i>Puccinia hordei</i>) - Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>)
Colza	- Alternariosi (<i>Alternaria brassicae</i>) - Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) - Oidio (<i>Erysiphe cruciferarum</i>) - Cilindrosporiosi (<i>Cylindrosporium concentricum</i>)

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento (tenero e duro) e orzo **1 litro per ettaro**
Intervenire nel periodo compreso tra l'accestimento e la fine della fioritura, in funzione della coltura e delle malattie da controllare. Non effettuare più di **2** trattamenti per anno con **LS METCONAZOLE 90**, distanziati di 14 giorni l'uno dall'altro.

Colza **0,8 litri per ettaro**
Alternariosi, oidio e cilindrosporiosi: iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi visibili sulle foglie o sulle silique.
Sclerotinia: distribuire il prodotto fungicida alla caduta dei primi petali, evitando di miscelarlo con insetticidi dannosi per i pronubi. Se necessario, ripetere l'applicazione dopo 14 giorni. Non effettuare più di **2** trattamenti per anno con **LS METCONAZOLE 90**.

- Si consiglia di usare **LS METCONAZOLE 90** nei periodi critici di sviluppo delle malattie sopra elencate.
- Si consiglia l'impiego di **LS METCONAZOLE 90** nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.
 - Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.
 - **LS METCONAZOLE 90** va diluito in 200-400 litri d'acqua ad ettaro.

FITOTOSSICITÀ

LS METCONAZOLE 90, applicato da solo e secondo le istruzioni qui riportate, non ha mai causato danni alle diverse cultivar di frumento (tenero e duro) ed orzo sin qui saggiate.
Su colza, **LS METCONAZOLE 90** può provocare un rallentamento temporaneo della crescita vegetativa, senza effetti negativi sulle rese finali della coltura.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- a) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare.
- b) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa.
- c) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria.
- d) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.
- e) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un bagnante non ionico (50 ml/hL).

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta di frumento e orzo, 56 giorni prima della raccolta di colza.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

LS METCONAZOLE 90

FUNGICIDA

FRUMENTO
ORZO
COLZA

90 g/L metconazolo
Concentrato emulsionabile (EC)

CONTENUTO NETTO:

1L

DA UTILIZZARE SOLO COME
FUNGICIDA PROFESSIONALE

lifescientific

LS METCONAZOLE 90

Fungicida ad ampio spettro d'azione per il controllo delle malattie di frumento, orzo e colza

Titolare dell'autorizzazione : Life Scientific Ltd - Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road - Dublin 4, IRELAND

Tel. + 353 1 2832024

Stabilimenti di produzione : Chemark Zrt - H-8182 Berhida, Peremarton gyártelep 06/75 hrsz, HU - Tel. +36 20 459 6996

Tipo di azione : Codice FRAC 3

Formulazione : Concentrato emulsionabile (EC)

ATTENZIONE



LS METCONAZOLE 90

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono: METCONAZOLO g 8,6 (90 g/l)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: ALCOLI, C9-11, ETOSILATI, DIETILEN GLICOLE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H373 Può provocare danni ai reni in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P260 Non respirare la polvere/i gas/la nebbia/i vapori.
P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P314 In caso di malessere, consultare un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.



Reg. del Ministero della Salute n. 18499 del 16/07/2024

UFI : 1QYD-JEY1-K00G-06RV

Leggere le istruzioni accluse prima dell'uso.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 luglio 2024

Lotto n. : vedi imballaggio



5

170190411101_V1