

GRUPPO 11 FUNGICIDA

LS AZOXY 250

FUNGICIDA

COLTURE ORTICOLE

250 g/L azoxystrobin
Sospensione concentrata (SC)

CONTENUTO NETTO:

5L



www.lifescientific.com


DA UTILIZZARE SOLO COME
FUNGICIDA PROFESSIONALE

lifescientific 

170010611101_V1

**LS AZOXY 250 - Fungicida ad ampio spettro per colture orticole.**

Titolare dell'autorizzazione : **Life Scientific Ltd** - Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road - Dublin 4, IRELAND - Tel. + 353 1 2832024
Officine di produzione : **SBM Formulation**, 21 Avenue Jean Foucault, 34535 Beziers, FRANCE
Tipo di azione : Gruppo FRAC, codice 11
Formulazione : **Sospensione concentrata (SC)**

ATTENZIONE**LS AZOXY 250****Composizione:**

100 g di prodotto contengono:
AZOXYSTROBIN puro g 23,2 (250 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene azoxystrobin, methanol

INDICAZIONI DI PERICOLO

H332 Nocivo se inalato.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH 208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P261 Evitare di respirare gli aerosol.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Registrazione Ministero della Salute n° 18996 del 15/12/2025

UFI : 6DYV-C0R5-H00U-US73

Leggere le istruzioni accluse prima dell'uso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 15 dicembre 2025

Data di produzione : vedi imballaggio
Lotto n. : vedi imballaggio



PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata non trattata di 10 metri per le colture orticole (tranne patata). Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli alcalini. Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti Azoxystrobin più di una volta ogni due anni per applicazione al suolo su patata.

Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.**

CARATTERISTICHE

LS AZOXY 250 è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporente della famiglia degli analoghi delle strobilurine. Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all’interno delle foglie (anche con movimento translaminare e sistemico), risultando efficace a basse dosi d’impiego sulle principali malattie delle colture orticole e delle floreali/ornamentali. LS AZOXY 250 è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis*, *Encarsia formosa*) e non favorisce lo sviluppo degli acari.

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO

COLTURE	MALATTIE	DOSI L/ha	VOLUMI D’ACQUA L/ha	NUMERO MASSIMO DI APPLICAZIONI/ANNO
Patata (applicare nei solchi di semina)	Rizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>) Antracnosi (<i>Colletotrichum coccodes</i>)	3	200-300	1 applicazione ogni due anni Non applicare il prodotto per immersione dei tuberi o su patate pregerminate
Aglio Cipolla Scalogno Porro (solo pieno campo)	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>) Ruggine (<i>Puccinia allii</i>), Alternaria (<i>Alternaria porri</i>)	0,8-1	300-600	3 (7-10; 10-14 giorni di intervallo) da prime foglie visibili a prefioritura
Carciofo (solo pieno campo)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>) Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	0,8-1	800-1000	3 (7-10 giorni di intervallo) dalle prime foglie visibili a pre-emergenza del capolino
Asparago (pieno campo)	Stemfiliosi (<i>Stemphylium botryosum</i>), Ruggine (<i>Puccinia asparagi</i>)	0,8-1	600-800	2 (10-14 giorni di intervallo) da 10% di sviluppo della superficie fogliare
Carota (pieno campo)	Alternaria (<i>Alternaria dauci</i>) Oidio (<i>Erysiphe heraclei</i>)	0,8-1	300-600	3 (10-14 giorni di intervallo) da prime foglie visibili fino a raccolta
Sedano (pieno campo)	Septoria (<i>Septoria apiicola</i>) Cercospora (<i>Cercospora apii</i> , <i>Cercosporidium punctum</i>)	0,8-1	800-1000	3 (7-10 giorni di intervallo) da prime foglie visibili fino a raccolta

COLTURE	MALATTIE	DOSI L/ha	VOLUMI D'ACQUA L/ha	NUMERO MASSIMO DI APPLICAZIONI/ANNO
Cavolfiore Cavolo cappuccio (solo pieno campo)	Alternaria (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Alternaria brassicicola</i>), Micosferella (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>)	0,8-1	600-800	2 (10-14 giorni di intervallo) da prime foglie visibili fino a raccolta
Melone, Cocomero, Zucca Cetriolo, Cetriolino, Zucchini	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Leveillula cucurbitacearum</i>) Pseudoperonospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Cancro gommoso (<i>Didymella bryoniae</i>)	0,8 -1 pieno campo 0,7-0,8 serra	500-1200	Oidio e Didimella 3 (7-10 giorni di intervallo) Peronospora 3 (5-7 giorni) di intervallo da prime foglie visibili fino alla raccolta
Fagiolo e fagiolino (solo pieno campo)	Ruggine (<i>Uromyces pisi</i>)	0,8-1	600-800	2 (10-14 giorni di intervallo) da prime foglie distese ad inizio sviluppo baccelli
Pisello Pisello proteico (solo pieno campo)	Antracnosi (<i>Ascochyta pisi</i> , <i>Ascochyta rabiei</i> , <i>Mycosphaerella pinodes</i>) Ruggine (<i>Uromyces pisi</i>) Oidio (<i>Erysiphe pisi</i>)	0,8-1	600-800	2 (10-14 giorni di intervallo) da prime foglie distese ad inizio sviluppo baccelli
Cavolfiore Cavolo cappuccio Cavolo di Bruxelles	Alternaria (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Alternaria brassicicola</i>), Micosferella (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>)	0,8-1	600-800	2 (10-14 giorni di intervallo) da prime foglie visibili fino a raccolta
Lattughe e insalate tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf (pieno campo)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>), Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	0,8-1	600-800	2 (7-10 giorni di intervallo) da prime foglie distese a raccolta
Erbe fresche (pieno campo e serra)	Peronospora, Septoria (per prezzemolo)	0,8-1	600-800	2 (7-10 giorni di intervallo) da prime foglie distese a raccolta
Pomodoro Peperone Melanzana (pieno campo e serra)	Alternaria (<i>Alternaria solani</i>) Cladosporiosi (<i>Cladosporium</i> spp., <i>Fulvia fulva</i>) Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,8-1	400-1500	3 (Pomodoro, Melanzana) 2 (Peperone) (7-10 giorni di intervallo) da prime foglie distese a raccolta
	Oidio (<i>Erysiphe</i> sp., <i>Leveillula taurica</i>)	0,8-1		
Fragola (pieno campo e serra)	Oidio (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0,8-1	600-800	3 (7-10 giorni di intervallo) dainfiorescenze visibili alla raccolta

- Applicare LS AZOXY 250 a carattere preventivo.
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette).

- Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.
- Per le applicazioni fare riferimento alla dose ettaro riportata in tabella.
- Non applicare il prodotto nei semenzai e nei viva.

STRATEGIA ANTIRESISTENZA

Non superare il numero massimo di trattamenti indicati. Per evitare la selezione di ceppi di funghi resistenti si raccomanda di seguire le linee guida FRAC specifiche per colture e patogeni.

FITOTOSSICITA'

LS AZOXY 250 può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canada, Mc Intosh e suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin).

Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con LS AZOXY 250 per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate. Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

COMPATIBILITA'

In ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida o acaricida.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Legumi da granella	35 giorni
Porro	21 giorni
Sedano, Fagiolo e Fagiolino, Piselli freschi con e senza baccello, Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa, Carota, Erbe fresche (in serra), Aglio, Cipolla, Scalogno	14 giorni
Carciofo, Lattughe e insalate, Erbe fresche (in campo)	7 Giorni
Pomodoro, Melanzana, Peperone, Cetriolo, Cocomero, Zucchini, Cetriolino, Melone, Zucca, Fragola	3 giorni
Patata, Asparago	<u>Non necessario</u>

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.