

GRUPPO 11 FUNGICIDA

LS AZOXYSTROBIN

FUNGICIDA

CEREALI A PAGLIA
RISO

250 g/L azoxystrobin
Sospensione concentrata (SC)

CONTENUTO NETTO:

5L



www.lifescientific.com

DA UTILIZZARE SOLO COME
FUNGICIDA PROFESSIONALE

lifescientific 

170010611104_V1

LS AZOXYSTROBIN - Fungicida ad ampio spettro per cereali a paglia e riso.

Titolare dell'autorizzazione : **Life Scientific Ltd** - Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road - Dublin 4, IRELAND - Tel. + 353 1 2832024
 Officine di produzione : **SBM Formulation**, ZI Avenue Jean Foucault, 34535 Béziers, FRANCE
 Tipo di azione : Gruppo FRAC, codice 11
 Formulazione : **Sospensione concentrata (SC)**

ATTENZIONE



LS AZOXYSTROBIN

Composizione:

100 g di prodotto contengono:
 AZOXYSTROBIN puro g 23,2 (250 g/l)
 Coformulanti q.b. a 100 g
 Contiene azoxystrobin, methanol

INDICAZIONI DI PERICOLO

H332 Nocivo se inalato.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH 208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P261 Evitare di respirare gli aerosol.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Registrazione Ministero della Salute n° 18995 del 15/12/2025

UFI : 6DYV-C0R5-H00U-US73

Leggere le istruzioni accluse prima dell'uso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 15 dicembre 2025

Data di produzione : vedi imballaggio
 Lotto n. : vedi imballaggio



PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata non trattata di 10 metri per frumento, orzo. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli alcalini. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli sabbiosi per riso. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.**

CARATTERISTICHE

LS AZOXYSTROBIN è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine.

Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento transaminare e sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie dei cereali.

Su frumento ed orzo (per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga) LS AZOXYSTROBIN determina una maggior produzione con elevata qualità; su riso l'efficacia su brusone ed elmintosporiosi consente aumenti quantitativi e qualitativi del raccolto.

LS AZOXYSTROBIN è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis*, *Encarsia formosa*) e non favorisce lo sviluppo degli acari.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

COLTURE	MALATTIE	DOSI l/ha	NUMERO MASSIMO DI APPLICAZIONI/ANNO
Frumento Orzo	Ruggini (<i>Puccinia recondita</i> , <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Puccinia hordei</i> , <i>Puccinia coronata</i>) Septoriosi (<i>Leptosphaeria nodorum</i>) Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Oidio (<i>Erysiphe</i> spp.)	0,8-1 l/ha	2 (14 giorni di intervallo tra un trattamento e l'altro) a partire da inizio levata fino a fine spigatura per orzo e fino a fine fioritura per frumento
Riso	Brusone (<i>Pyricularia oryzae</i>) Elmintosporiosi (<i>Helminthosporium oryzae</i>)	1 l/ha	2 (14 giorni di intervallo tra un trattamento e l'altro)

Applicare LS AZOXYSTROBIN a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.

- Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell'andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse malattie.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-300 l/ha).
- Su riso con condizioni molto favorevoli allo sviluppo del brusone, intervenire tra la botticella e l'inizio della spigatura ripetendo l'applicazione a distanza di 14 giorni. Non aprire le bocchette di uscita per 7 giorni a partire dal trattamento.
- Utilizzare volumi di acqua compresi tra 200 – 300 l/ha.

STRATEGIA ANTIRESISTENZA

Non superare il numero massimo di trattamenti indicati. Per evitare la selezione di ceppi di funghi resistenti si raccomanda di seguire le linee guida FRAC specifiche per colture e patogeni.

FITOTOSSICITA'

LS AZOXYSTROBIN può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canada, McIntosh e suoi derivati (es. Summerred), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin).

Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con LS AZOXYSTROBIN per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate. Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

COMPATIBILITA'

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi.

Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Frumento, Orzo	35 giorni
Riso	28 giorni

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.