

# AGROACEITE INSECTICIDA DE CONTACTO

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE  
LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL  
MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y  
Material Fitosanitario con el N° 13659.

COMPOSICIÓN: Aceite de parafina 83% [EC] P/V  
Concentrado emulsionable (EC)

CONTENIDO NETO:  
**25 L**

USO PROFESIONAL AGRARIO

Certificado por:



"Apto para su uso en agricultura ecológica  
conforme la Norma UNE 315500-Insumos  
utilizables en la producción vegetal  
ecológica. Productos para la gestión de  
plagas y enfermedades"



**life scientific** © Spain  
FIRST TO MARKET

REGISTRADO Y FABRICADO POR: Life Scientific Spain, S.L.U.  
C/Almirante Cadarso, 26 46005 (Valencia)

Fecha y lote de fabricación: Véase el envase

## ATENCIÓN



UFI: E300-E004-V008-GKKD

- **H410** Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.
- **P261** Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- **P262** Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- **P280** Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección.
- **P391** Recoger el vertido.
- **P501** Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

### RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. • En caso de ingestión, enjuagarse la boca, NO provocar el vómito y no administrar nada por vía oral. • Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. • Controle la tensión arterial. • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. • Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. • NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: (91) 562 04 20.  
(En ambos casos, tenga a mano el envase o la etiqueta)

### MITIGACIÓN DE RIESGOS DURANTE LA MANIPULACIÓN

Seguridad del aplicador Aire libre: • MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Pulverizaciones normales manuales y con tractor: ropa de trabajo y guantes de protección química.

• **Aplicación:** Mediante tractor: ropa de trabajo. Mediante aplicación normal: ropa de trabajo y guantes de protección química.

**Seguridad del trabajador.** Ropa de trabajo (durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada).

**Reducción del riesgo.** Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo. • No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. • Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

### MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de: • 15 m para frutales • 20 m para cítricos • 30 m para platanera.

SPe3: Para proteger a los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m para platanera hasta la zona no cultivada. Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

**ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO Y/O CALDO:** SP1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de las aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

**CARACTERÍSTICAS:** AGROACEITE es un insecticida formulado a base de aceite de parafina. Actúa por contacto, penetrando en la tráquea de los insectos provocando su muerte por asfixia.

### USOS Y DOSIS AUTORIZADAS:

| USO                | AGENTE                | AGENTE (Nombre científico) | Dosis             | Nº aplicaciones | Intervalos (días) | Volumen de caldo | Condic. específico                                                                                             |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cítricos           | Áfidos, pulgones      | <i>Aphididae</i>           | 1-1,5% 20-45 l/ha | 2               | 10                | 2000-3000 l/ha   | Naranja, limonero, pomelo mandarino, clementino. Tratar antes del cambio de color de los frutos, hasta BBCH 79 |
|                    | Cochinillas harinosas | <i>Pseudococcidae</i>      |                   |                 |                   |                  |                                                                                                                |
|                    | Cochinillas           | <i>Coccidae</i>            |                   |                 |                   |                  |                                                                                                                |
|                    | Moscas blancas        | <i>Aleyrodidae</i>         |                   |                 |                   |                  |                                                                                                                |
| Frutales de hueso  | Ácaros                |                            | 0,75-1% 6-10 l/ha | 1               | —                 | 800-1000 l/ha    | Tratar antes de cambio de floración, hasta BBCH 59                                                             |
|                    | Áfidos, pulgones      | <i>Aphididae</i>           |                   |                 |                   |                  |                                                                                                                |
|                    | Cochinillas harinosas | <i>Pseudococcidae</i>      |                   |                 |                   |                  |                                                                                                                |
|                    | Cochinillas           | <i>Coccidae</i>            |                   |                 |                   |                  |                                                                                                                |
| Frutales de pepita | Ácaros                |                            | 0,75-1% 6-10 l/ha | 1               | —                 | 800-1000 l/ha    | Manzano, peral, membrillero, níspero. Tratar antes de cambio de floración, hasta BBCH 59                       |
|                    | Áfidos, pulgones      | <i>Aphididae</i>           |                   |                 |                   |                  |                                                                                                                |
|                    | Cochinillas harinosas | <i>Pseudococcidae</i>      |                   |                 |                   |                  |                                                                                                                |
|                    | Cochinillas           | <i>Coccidae</i>            |                   |                 |                   |                  |                                                                                                                |
| Platanera          | Ácaros                |                            | 1-1,5% 15-45 l/ha | 1               | —                 | 1500-3000 l/ha   | Aplicar durante todo el ciclo vegetativo.                                                                      |
|                    | Áfidos, pulgones      | <i>Aphididae</i>           |                   |                 |                   |                  |                                                                                                                |
|                    | Cochinillas harinosas | <i>Pseudococcidae</i>      |                   |                 |                   |                  |                                                                                                                |
|                    | Cochinillas           | <i>Coccidae</i>            |                   |                 |                   |                  |                                                                                                                |

PLAZO DE SEGURIDAD: NO PROCEDE (NP)

### CONDICIONES GENERALES DE USO:

Tratamiento insecticida en cítricos contra cochinillas, mosca blanca y pulgón; en frutales de hueso y pepita contra cochinillas, ácaros y pulgón; y en platanera contra cochinillas, mosca blanca y pulgón.

Aplicar en pulverización normal con un volumen de agua suficientemente alto para alcanzar la parte aérea de las plantas. No aplicar este producto hasta pasados 40 días después de haber dado un tratamiento con azufre ni cuando se prevean heladas ni en días calurosos y secos. No debe aplicarse en condiciones de estrés hídrico. Observar precauciones de fitotoxicidad en variedades de frutales sensibles a los aceites. Aplicar en plantas sanas y vigorosas.

**ADVERTENCIA:** Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

**GESTIÓN DE ENVASES:** Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Prohibido reutilizar el envase.

