

GRUPO

11

FUNGICIDA

AZOXYSTAR®

FUNGICIDA

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉANSE DETENIDAMENTE
LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO
AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Inscrito en el Registro Oficial de Productos
y Material Fitosanitario con el n° 25934

Composición: Azoxistrobin, 25% p/v
en forma de suspensión concentrada (SC)

CONTENIDO NETO:

5L

USO RESERVADO A AGRICULTORES
Y APLICADORES PROFESIONALES

lifescientific 
FIRST TO MARKET



170010620713 V1

AZOXYSTAR® es un fungicida del grupo de las estrobilurinas con acción sistémica y translaminar y efecto preventivo y curativo. Presenta actividad contra numerosas enfermedades producidas por hongos en diversos cultivos.



ATENCIÓN

- H410** Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261** Evitar respirar el polvo/el humo /el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
- P262** Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P273** Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280** Llevar guantes y prendas de protección.
- P391** Recoger el vertido.
- P501** Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
- EUH208** Contiene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.
- EUH 401** A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Registrado y fabricado por:

Life Scientific Ltd

Block 4, Belfield Office Park

Beech Hill Road, Dublin 4

IRLANDA

Tel: +353 1 283 2024 - Fax: +353 1

283 2026

Email: info@lifescientific.com



**AGITAR BIEN
ANTES DE USAR**

UFI: 6DYV-C0R5-H00U-US73

Gestión de envases

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG).

Enjuague energícamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).



Prohibido reutilizar el envase

Fecha y lote de fabricación: Véase el envase



LA 714209010071

PRENDIDA PARA VER LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL FOLLETO

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuagarse la boca, NO provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
- Alteraciones renales, hipotensión, acidosis metabólica.
- Narcosis por afectación del Sistema Nervioso Central.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático y de soporte.
- Considerar realización de pruebas de función hepática, renal, gases arteriales y electrolitos.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O

LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Tel. 91 562 04 20

(En ambos casos, tenga a mano el envase o la etiqueta)

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador

Aplicación al aire libre con tractor:

- Mezcla, carga, limpieza y mantenimiento del equipo: ropa de trabajo y guantes de protección química.
- Aplicación: ropa de trabajo
- Guantes de protección química

Seguridad del trabajador

Ropa de trabajo manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

No entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco.

Mitigación de riesgos medioambientales

SPe3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua superficial.

SP1 No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/ Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.]

CARACTERÍSTICAS

AZOXYSTAR® es un fungicida del grupo de las estrobilurinas con acción sistémica y translinar y efecto preventivo y curativo. Presenta actividad contra numerosas enfermedades producidas por hongos en diversos cultivos.

USOS Y DOSIS AUTORIZADAS. MODO DE EMPLEO

Cultivo	Enfermedades	Dosis l/ha	N° máximo aplicaciones	Intervalos	Volumen de Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Camelina	Colletotrichum spp.	1	2	14	100-300 l/ha	Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).
Camelina	Sclerotinia spp.	1	2	14	100-300 l/ha	
Cáñamo	Colletotrichum spp.	1	2	14	100-300 l/ha	Contra antracnosis (Colletotrichum spp.). Para uso industrial
Cáñamo	Sclerotinia spp.	1	2	14	100-300 l/ha	Para uso industrial
Cebada	Blumeria graminis	1	2	14	100-300 l/ha	
Cebada	Escaldado de cereales	1	2	14	100-300 l/ha	
Cebada	Helminthosporiosis reticular de la cebada	1	2	14	100-300 l/ha	
Cebada	Pyrenophora teres	1	2	14	100-300 l/ha	
Cebada	Oídio de los cereales	1	2	14	100-300 l/ha	
Cebada	Rincosporium, rhynchosporium secalis	1	2	14	100-300 l/ha	
Cebada	Roya	1	2	14	100-300 l/ha	
Cebada	Puccinia	1	2	14	100-300 l/ha	
Centeno	Escaldado de cereales	1	2	14	100-300 l/ha	
Centeno	Rincosporium, rhynchosporium secalis	1	2	14	100-300 l/ha	
Céspedes de gramíneas	Roya	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para producción de simientes.
Céspedes de gramíneas	Enfermedades fúngicas	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para producción de simientes. Contra enfermedades fúngicas que provocan manchas foliares.
Céspedes de gramíneas	Puccinia spp.	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para producción de simientes.
Colza	Colletotrichum spp.	1	2	14	100-300 l/ha	Incluye nabina. Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).
Colza	Sclerotinia spp.	1	2	14	100-300 l/ha	Incluye nabina

Cultivo	Enfermedades	Dosis l/ha	Nº máximo aplicaciones	Intervalos	Volumen de Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Gramíneas (prados de siembra)	Enfermedades fúngicas	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para producción de simientes. Contra enfermedades fúngicas que provocan manchas foliares
Gramíneas (prados de siembra)	Roya	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para producción de simientes.
Gramíneas (prados de siembra)	Puccinia spp.	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para producción de simientes.
Guisantes para grano	Antracnosis del haba	0,8	2	14	100-300 l/ha	De primavera a invierno. La aplicación se realizará como máximo hasta el estado BBCH 60 (primeras flores abiertas).
Guisantes para grano	Botritis	0,8	2	14	100-300 l/ha	De primavera a invierno. La aplicación se realizará como máximo hasta el estado BBCH 60 (primeras flores abiertas). Plazo de seguridad: Guisante para grano de primavera: 35 días; Guisante para grano de invierno: 14 días.
Guisantes para grano	Colletotrichum Lindemuthianum	0,8	2	14	100-300 l/ha	De primavera a invierno. La aplicación se realizará como máximo hasta el estado BBCH 60 (primeras flores abiertas). Plazo de seguridad: Guisante para grano de primavera: 35 días; Guisante para grano de invierno: 14 días.
Guisantes para grano	Erysiphe spp.	1	2	14	100-300 l/ha	De primavera a invierno. La aplicación se realizará como máximo hasta el estado BBCH 60 (primeras flores abiertas). Plazo de seguridad: Guisante para grano de primavera: 35 días; Guisante para grano de invierno: 14 días.

Cultivo	Enfermedades	Dosis l/ha	Nº máximo aplicaciones	Intervalos	Volumen de Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Guisantes para grano	Roya del guisante, Uromyces pisi	1	2	14	100-300 l/ha	De primavera a invierno. La aplicación se realiza como máximo hasta el estado BBCH 60 (primeras flores abiertas). Plazo de seguridad: Guisante para grano de primavera: 35 días; Guisante para grano de invierno: 14 días.
Guisantes verdes	Antracnosis del haba	0,8	2	14	100-300 l/ha	Para producción sin vaina.
Guisantes verdes	Botritis	0,8	2	14	100-300 l/ha	Para producción sin vaina
Guisantes verdes	Colletotrichum Lindemuthianum	0,8	2	14	100-300 l/ha	Para producción sin vaina
Guisantes verdes	Erysiphe spp.	1	2	14	100-300 l/ha	Para producción sin vaina
Guisantes verdes	Roya del guisante, Uromyces pisi	1	2	14	100-300 l/ha	Para producción sin vaina
Haba para grano	Antracnosis del haba	0,8	2	14	100-300 l/ha	
Haba para grano	Colletotrichum lindemuthianum	0,8	2	14	100-300 l/ha	
Hortícolas	Enfermedades fúngicas	1	2	14	100-300 l/ha	Para la producción de semillas. Contra enfermedades fúngicas que provocan manchas foliares.
Hortícolas	Erysiphaceae	1	2	14	100-300 l/ha	Para la producción de semillas
Hortícolas	Peronosporaceae	1	2	14	100-300 l/ha	Contra mildius (Peronosporaceae). Para la producción de semillas
Hortícolas	Oidios	1	2	14	100-300 l/ha	Para la producción de semillas
Hortícolas	Pucciniaceae	1	2	14	100-300 l/ha	Para la producción de semillas
Hortícolas	Roya	1	2	14	100-300 l/ha	Para la producción de semillas
Hortícolas	Colletotrichum	0,8	2	14	100-300 l/ha	Para la producción de semillas. Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).

Cultivo	Enfermedades	Dosis l/ha	Nº máximo aplicaciones	Intervalos	Volumen de Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Judías para grano	Antracnosis del haba	0,8	2	14	100-300 l/ha	
Judías para grano	Colletotrichum Lindemuthianum	0,8	2	14	100-300 l/ha	
Leguminosas forrajeras	Antracnosis del haba	0,8	2	14	100-300 l/ha	Para cultivo productivo
Leguminosas forrajeras	Colletotrichum Lindemuthianum	0,8	2	14	100-300 l/ha	Para cultivo productivo
Leguminosas forrajeras	Roya. Uromyces spp.	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para la producción de simientes
Leguminosas forrajeras	Enfermedades fúngicas	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para la producción de simientes. Contra enfermedades fúngicas que provocan manchas foliares
Lino	Colletotrichum	1	2	14	100-300 l/ha	Contra antracnosis (Colletotrichum spp.). Para fibra
Lino	Sclerotinia spp.	1	2	14	100-300 l/ha	Para fibra
Maiz	Tizón del maíz, niebla, Exserohilum turcicum	1	1	-	100-300 l/ha	Contra helmintosporiosis del maíz (Exserohilum turcicum)
Mostaza, mostaza blanca	Colletotrichum spp.	1	2	14	100-300 l/ha	Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).
Mostaza blanca	Sclerotinia spp.	1	2	14	100-300 l/ha	
Ornamentales herbáceas	Enfermedades fúngicas	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para producción de simientes de especies florales. Contra enfermedades fúngicas que provocan manchas foliares.
Ornamentales florales o de flor	Erysiphaceae	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para producción de simientes de especies florales
Ornamentales florales o de flor	Peronosporaceae	1	2	14	100-300 l/ha	Contra mildius (Peronosporaceae). Exclusivamente para producción de simientes de especies florales
Ornamentales florales o de flor	Pucciniaceae	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para producción de simientes de especies florales

Cultivo	Enfermedades	Dosis l/ha	Nº máximo aplicaciones	Intervalos	Volumen de Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Ornamentales florales o de flor	Oidio	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para producción de simientes de especies florales
Ornamentales florales o de flor	Roya	1	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para producción de simientes de especies florales
Ornamentales florales o de flor	Colletotrichum spp.	0,8	2	14	100-300 l/ha	Exclusivamente para producción de simientes de especies florales. Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).
Trigo	Blumeria graminis	1	2	14	100-300 l/ha	
Trigo	Fusariosis, fusarium spp.	1	2	14	100-300 l/ha	
Trigo	Oidio de los cereales	1	2	14	100-300 l/ha	
Trigo	Puccinia spp.	1	2	14	100-300 l/ha	
Trigo	Royas	1	2	14	100-300 l/ha	
Trigo	Septoriosis de las espigas del trigo, parastagonospora Nodorum Trigo septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici	1	2	14	100-300 l/ha	

Aplicar mediante pulverización normal con tractor.

PLAZOS DE SEGURIDAD

Uso	P.S. (días)
Guisantes verdes,	14
Camelina, Cáñamo, Colza, Lino, Mostaza, Mostaza blanca,	21
Guisantes para grano	GUISANTE DE PRIMAVERA: 35 GUISANTE DE INVIERNO: 14
Cebada, Centeno, Haba para grano, Judía para grano, Leguminosas forrajeras, Trigo	42
Maíz	50
Céspedes de gramíneas, Gramíneas (prados de siembra), Horticolas, Leguminosas forrajeras, Ornamentales herbáceas	NO PROCEDE

RECOMENDACIONES

Almacenar en su envase original bien cerrado, en un lugar seco, fresco (< 40°C) y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar.

A efectos de evitar resistencias se recomienda alternar los tratamientos con fungicidas de diferente modo de acción.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.